

Annexe 7.1 :

Quand le pharmacien et/ou le préparateur peuvent-ils suspecter un cas de grippe aviaire ?

• Questions à poser dans le contexte d'une circulation de virus Influenza aviaire A/H5N1 sans transmission interhumaine (phases 3A et 3B [fiche mémo 1]) à toute personne présentant un syndrome respiratoire aigu bénin ou modéré, c'est-à-dire une fièvre > 38°C et une toux et/ou dyspnée :

1. « Depuis 7 jours, revenez-vous d'un pays étranger* et si oui, y étiez-vous pour des raisons professionnelles ou touristiques? »
2. « Depuis 7 jours, avez-vous eu des contacts prolongés, répétés et à moins d'un mètre avec des oiseaux d'élevage ou de compagnie vivants ou morts ou leurs fientes, dans un pays ou une zone où ces oiseaux sont infectés par le virus H5N1* (et/ou dans un pays ou une zone où des décès massifs d'oiseaux ont été signalés) ?
3. Depuis 7 jours, avez-vous eu un contact direct avec des oiseaux sauvages vivants ou morts dans une zone ou un pays infectés par le virus H5N1* (et/ou dans un pays ou une zone où des décès massifs d'oiseaux ont été signalés) ?
4. « Depuis 7 jours, avez-vous eu un contact très proche et répété avec un cas humain confirmé de grippe H5 (à fortiori H5N1) ou suspecté de l'être ? »
5. « Depuis 7 jours, avez-vous eu une exposition professionnelle avec des prélèvements biologiques d'origine animale ou humaine infectés ou présumés de l'être par le virus H5N1 ? »

* Listes « de pays ou régions où des oiseaux d'élevage, de compagnie ou sauvages, sont touchés, avec ou sans cas humains » régulièrement mises à jour sur le site de l'InVS [source : www.invs.sante.fr] et connues du SAMU- centre 15.

Résultats : En cas de réponses positives à la question 1 et à au moins l'une des questions 2, 3, 4 ou 5, il s'agit d'un cas suspect et le pharmacien doit contacter le SAMU-centre 15 pour une évaluation téléphonique du cas. Si le cas apparaît possible, le SAMU-centre 15 contacte l'institut de veille sanitaire (InVS) en vue de valider la classification et de poursuivre les investigations. Le SAMU-centre 15 organisera si besoin le transport du patient vers un établissement de santé afin de faire réaliser un prélèvement naso-pharyngé à visée diagnostique.

• Questions à poser dans le contexte d'un début de transmission interhumaine (phases 4A, 4B, 5A et 5B [fiche mémo 1]) sachant que les symptômes cliniques ne seront réellement connus que lors de ces phases et seront alors transmis aux pharmaciens d'officine par des organismes officiels (DDASS...).

Aux questions précédentes s'ajoutent les questions ayant rapport avec une possible transmission interhumaine :

« Depuis 7 jours, avez-vous été en contact avec des cas possibles ou confirmés de grippe à virus pandémique ? »

• En période pandémique (phase 6 [fiche mémo 1]), c'est généralement vers le médecin généraliste qu'il faudra orienter le patient, ou à défaut le centre de coordination sanitaire et sociale dont vous dépendez. Si le patient doit être hospitalisé au vu de son état, le SAMU-centre 15 doit être appelé.

• Remarques :

Tant qu'un cas possible n'est ni exclu ni confirmé, il est considéré comme « en cours d'investigation ».

Cas exclu : Un cas suspect est exclu s'il ne rentre pas dans la définition de cas. Un cas possible est à priori exclu si les résultats de l'investigation biologique sont négatifs (absence d'infection à H5N1).

Cas confirmé : Cas possible ayant été confirmé biologiquement comme une infection liée au virus grippal de type H5N1 par les laboratoires agréés et Centres nationaux de référence (CNR-grippe).

Fiche élaborée en s'inspirant de la « définition de cas humain possible de grippe aviaire H5N1 de l'InVS (mise à jour au 29/04/2008) » (source : www.invs.sante.fr), de la fiche mémo 2 intitulée « Quand suspecter un cas de grippe aviaire ? » extraite du site du Ministère de la Santé et des Solidarités, dossier grippe aviaire : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/sommaire.htm et en

collaboration avec J.P. Boulé, médecin responsable de la prévention et de la gestion des crises pour les DDASS du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.

Annexe 7.2 : QUESTIONNAIRE D'UN CAS POSSIBLE DE GRIPPE AVIAIRE H5N1(PHASE 3)

Fiche pratique à compléter par le pharmacien après interrogatoire du patient pour l'aider à ensuite mieux retranscrire les informations importantes, par téléphone (15) au SAMU qui lui indiquera alors la démarche à suivre au cas par cas.

Caractéristiques du malade

Nom : Prénom : Sexe : M F

Date de naissance : / - - / - - / - - - - / ou âge : / - - /

Profession (si épizootie en France)

Adresse du domicile en France :

.....

Code Postal : /...../ Commune :

Tel domicile : / - - / - - / - - / - - / - - / Portable : / - - / - - / - - / - - / - - /

Coordonnées du médecin traitant :

.....
.....

Exposition à risque

Pendant les 7 jours précédant les premiers signes, notion de résidence, travail ou retour d'une zone touchée par une épizootie : Oui Non

Date de retour (ou dernière exposition) : / - - / - - / - - - - /

Pendant les 7 jours précédant les premiers signes, le patient avait (cocher la ou les case(s) correspondante(s) et pour chaque facteur coché, donner la date de la dernière exposition) :

Soit une exposition professionnelle avec :

- des élevages de volailles dans une zone avec épizootie à virus H5N1 ; / - - / - - / - - - - /
- des humains ou animaux infectés par le virus H5N1 ; / - - / - - / - - - - /
- des prélèvements biologiques infectés dans un laboratoire manipulant du H5N1. / - - / - - / - - - - /

Soit un des facteurs suivants :

- contact prolongé, répété et à moins d'un mètre avec des volatiles* vivants ou morts, ou leurs fientes (* et/ou autres animaux à préciser selon le contexte). / - - / - - / - - - - /
- contact avec un cas humain confirmé de grippe H5. / - - / - - / - - - - /

Lieu (Pays/Province/Ville) de l'exposition :

Etat clinique à la date du signalement Préciser la date : / - - / - - / - - - - /

Date des premiers signes cliniques : / - - / - - / - - - - /

Fièvre (Préciser / - - / ° C)

Toux et/ou Dyspnée

Courbatures Conjonctivite Autres symptômes Précisez :

Le patient a-t-il reçu des antiviraux antineuraminidases ?

Non Oui Si oui, débutée le / - - / - - / - - - - / Ne sait pas

Fiche inspirée du « Questionnaire d'un cas possible de grippe aviaire H5N1 (phase 3) » (Source : www.invs.sante.fr) et réalisée en collaboration avec J.P. Boulé, médecin « Prévention et gestion des crises » des DDASS du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.